



Asociación Mexicana de
Tanatología, A.C.



Asociación Michoacana
de Apoyo Tanatológico

VIII CONGRESO NACIONAL DE TANATOLOGÍA

VIDA Y MUERTE

UNA RELACIÓN TRASCENDENTAL

Del 10 al 13 de Noviembre, Morelia, Mich.

M E M O R I A S

AMTAC:

Insurgentes Sur # 1160 3er Piso,
(Entre Miguel Laurent y Tlacoquemecatl,
Frente a Parque Hundido)
Col. Del Valle, C.P. 03100
Tels. 55.75.59.95 y 55.75.59.96
Fax: 55.75.41.95
www.tanatologia-amtac.com
E-Mail: info@tanatologia-amtac.com
Twitter: [@tanatologiamex](https://twitter.com/tanatologiamex)

AMAT

Teléfono (443) 3 24 41 25,
Celular (443) 3 11 22 75
Fresno núm. 329, Fray Antonio de San
Miguel, Morelia
(Atrás de Plaza Morelia)
amat-morelia@hotmail.com

EL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO Y EL MANEJO DE SU PÉRDIDA, HISTORIAS DE VIDA

Dulce María Cocom Andrade^{1*}, Ana Aurea Torres Márquez², Juan Carlos Arreguín Rivera*, Carolina Manrique Nava³ y Rosa María Roldán Gómez*

RESUMEN

La diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por aumento en los niveles de glucosa en sangre que ocupa el primer lugar en número de defunciones por año en nuestro país y día a día va en aumento. En la actualidad es uno de los problemas de salud más preocupantes, ya que la prevalencia en México es del 14%, lo que implica un total de 8 millones de personas con diabetes, lo que implica gastos médicos de dos a cinco veces más altos que los de una persona sin esta enfermedad. Sus complicaciones pueden llevar al deterioro de varios órganos y sistemas y, en situaciones más drásticas, a la muerte. Una de las complicaciones de mayor frecuencia en la diabetes es la ulceración del pie diabético, que si bien, no pone en riesgo la vida, ocasiona problemas psicológicos, económicos y laborales que afectan al paciente. Por ello interesa describir la percepción del paciente con pie diabético acerca de los cuidados que se le proporcionan a nivel individual-familiar como institucional. El diseño de investigación corresponde al tipo cualitativo, en el cual se aplica el método de historia de vida, obteniendo información acerca de la forma como el paciente con pie diabético percibe su manejo de pérdida de una parte de su extremidad inferior. Para ello se realizaron cinco entrevistas a pacientes adultos de ambos sexos con diagnóstico de pie diabético. En general se encuentra que los pacientes manifiestan una diversidad de sentimientos, tales como la: frustración, depresión, tristeza, desesperanza y abandono, a los cuales atribuyen el incumplimiento de sus cuidados respecto a su enfermedad. En el momento de las entrevistas, los pacientes manifestaron una tristeza profunda que derivó en el llanto, y que atribuyen a la pérdida de una parte de los miembros inferiores, aunado a la soledad que los llevó a esta consecuencia. Por lo tanto se puede decir que los pacientes con pie diabético perciben sus cuidados de manera diferente según la vida que han llevado y el momento emocional en que se encuentren; ya que si bien en la mayoría se encontró desinterés y despreocupación, éste se origina del estado de depresión en el que se encontraban los pacientes.

¹ EETI de la Semar. glucosweet@hotmail.com

² EESU. Adscrita al ISSSTE. anaautm@yahoo.com

³ Docente-Investigadora Adscrita al CIECAS-IPN. manrique_nava@hotmail.com