



ASOCIACIÓN MEXICANA
DE TANATOLOGÍA, A. C.

Pionera de la
Tanatología en México

MEMORIAS DEL
IX CONGRESO NACIONAL
DE TANATOLOGIA

MUERTE DIGNA
UN ABORDAJE INTEGRAL

DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2012

Centro Libanés, Cd. de México

Asociación Mexicana de Tanatología, A. C.
Insurgentes Sur 1160-3er piso, Col. Del Valle
Tels. 55-75-59-95 ó 96 E-Mail: info@tanatologia-amtac.com
www.tanatologia-amtac.com / Twitter: [@tanatologiamex](https://twitter.com/tanatologiamex)
Facebook: <http://www.facebook.com/tanatologiamex>



PREVALENCIA DE DISFUNCIÓN EMOCIONAL DEL CUIDADOR PRIMARIO DE PACIENTES ONCOPEDIÁTRICOS EN EL HOSPITAL GENERAL DE TAMPICO “DR. CARLOS CANSECO”

Lic. Dulce María Peraza Llovera, Dra. Liliana Ortiz Suarez, Dr. José Martín Torres Benítez.

Departamento de Psicología
Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”

Objetivo.

Evaluar el grado emocional de los cuidadores primarios con pacientes oncopediátricos, mediante el instrumento de medición “Termómetro de las siete emociones del duelo”.

Material y Métodos.

Se realizó el estudio en el Pabellón de Oncopediatria del Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”. El cual consta de 50 pacientes con enfermedad de Cáncer Infantil. En tratamiento: 24 pacientes (2-17 años). En vigilancia 26 pacientes (2-19 años)

El total de la muestra fueron de 13 Cuidadores Primarios con Pacientes Oncopediatricos. Los criterios de inclusión fueron pacientes en Tratamiento y Vigilancia que reportara el médico tratante alteración emocional observable durante el proceso de la Enfermedad/tratamiento.

Se aplicó el Instrumento de medición “Termómetro de las Emociones del Duelo” diseñado por la Tanatóloga Dra. Martha Palencia, validado en estudios previos en el Estado de Morelos.

Resultados

Se observa una mínima diferencia de la prevalencia de disfunción emocional entre hombres y mujeres que son cuidadores primarios de pacientes Oncológicos Pediátricos. En donde se obtiene como resultado que los hombres presentan una disfunción emocional mayor con un 5.7 de promedio. Y las mujeres una disfunción emocional menor con un 5.6 de promedio

En las mujeres se observó que en la tristeza presentan mayor disfunción emocional, obteniendo un 7.9 de promedio. Y en la soledad presentan menor disfunción emocional con un 3.3 de promedio. En cuanto a los hombres se encontró que en la tristeza presentaron mayor disfunción emocional con un 7 de promedio, y en la culpa reflejaron menor disfunción emocional con un promedio de 2.5.

Conclusiones

- 1.- La prevalencia de disfunción emocional se observó más alta en hombres.
- 2.- El mayor grado de emoción se observó en la tristeza prevaleciendo en mujeres y en los hombres la culpa.
- 3.- A mayor tiempo de diagnóstico fue mayor la disfunción emocional.

Bibliografía

1. Gonzales-Barón-M. Tratado de Medicina Paliativa y Tratamiento de soporte en el enfermo con Cáncer. Interamericana. 1994.
2. Silva RCF. Cuidados Paliativos Oncológicos. Cuidados Paliativos durante el proceso de morir. Cad. Saude Pública. Sao Paulo. 2008.
3. Castañeda-AM. El Duelo en pacientes y familias en situaciones de urgencia y cuidados críticos. Guía para el psicólogo emergencista. Perú. 2003.